

Stime di prevalenza dell'uso problematico di sostanze nella provincia di Palermo - Anno 2012

Autori: Marco Berardi e Marina Ciaramitaro

Introduzione

Nell'ambito della collaborazione tra l'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze e l'Osservatorio Epidemiologico Provinciale dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, è stata realizzata un'indagine volta a rilevare l'uso problematico di sostanze psicoattive (PDU – Problem Drug Use) nella popolazione residente nella provincia di Palermo, promossa dal Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il consumo problematico di sostanze (PDU) rappresenta un importante indicatore fissato dall'Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) per il monitoraggio del fenomeno *droghe*. Tale indicatore, che interessa il consumo di sostanze stupefacenti per via iniettiva e il consumo a lungo termine e/o regolare di oppiacei e stimolanti ha l'obiettivo di indagare i pattern di consumo più gravi che sfuggono alla rilevazione di indagini campionarie di popolazione. Applicando opportune metodologie che sfruttano al massimo l'informazione sulla quota di utilizzatori afferenti sia ai servizi sanitari specialistici che ad altre strutture di assistenza sul territorio è possibile stimare il cosiddetto *sommerso*, rappresentato da quei soggetti che, residenti nell'area d'interesse, seppure utilizzatori problematici di sostanze psicoattive, non hanno richiesto alcun tipo di trattamento.

Obiettivo

Stimare per l'anno 2012 la prevalenza di soggetti con uso problematico di sostanze psicoattive nel territorio della provincia di Palermo.

Metodologia

Le informazioni sugli utilizzatori problematici di sostanze sono state rilevate attraverso la piattaforma socio-sanitaria informatica *mFp 5 web* in dotazione presso i Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T.) dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. I dati sono stati incrociati con l'archivio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) relativa ai soggetti residenti ricoverati nel 2012 con diagnosi principale o secondaria di uso o abuso di sostanze stupefacenti, oppiacei e stimolanti (cocaina, amfetamine, metamfetamine).

Per determinare la stima del numero di soggetti, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, utilizzatori problematici sul territorio, è stata utilizzata la metodologia "cattura/ricattura" a due fonti.

Per stimare la prevalenza di utilizzo si è fatto riferimento alla popolazione residente nella provincia (Istat 2011)



Risultati

Nel territorio sono stati stimati complessivamente 6.615 utilizzatori problematici (IC 95% 5.313-8.497) corrispondenti ad una prevalenza di 8 soggetti per 1.000 residenti.

La stima riferibile all'uso problematico di soli oppiacei interessa 4.530 soggetti (IC 95% 3.522-6.246) corrispondenti ad una prevalenza stimata di 5 soggetti per 1.000 residenti. L'utilizzo problematico di sostanze stimolanti (cocaina, amfetamine, metamfetamine) interessa invece 1.640 soggetti (IC 95% 804-3.846) corrispondenti ad una prevalenza stimata di 2 soggetti per 1.000 residenti.



Popolazione residente in provincia di Palermo: 1.243.585 (censimento 2011)

Tabella 1

Utilizzo problematico di SOSTANZE STUPEFACENTI, stime dei casi prevalenti e della prevalenza per mille residenti di età 15-64

Metodologia	Casi prevalenti (numero soggetti)			Prevalenza (casi per 1.000 residenti 15-64 anni)		
	Stima	IC INF (95%)	IC SUP (95%)	Stima	IC INF (95%)	IC SUP (95%)
Cattura/Ricattura	6615,00	5313,13	8497,08	8,02	6,44	10,30

Tabella 2

Utilizzo problematico di OPIACEI, stime dei casi prevalenti e della prevalenza per mille residenti di età 15-64

Metodologia	Casi prevalenti (numero soggetti)			Prevalenza (casi per 1.000 residenti 15-64 anni)		
	Stima	IC INF (95%)	IC SUP (95%)	Stima	IC INF (95%)	IC SUP (95%)
Cattura/Ricattura	4529,90	3522,03	6246,29	5,49	4,27	7,57

Tabella 3

Utilizzo problematico di STIMOLANTI (cocaina, amfetamine, metamfetamine), stime dei casi prevalenti e della prevalenza per mille residenti di età 15-64

Metodologia	Casi prevalenti (numero soggetti)			Prevalenza (casi per 1.000 residenti 15-64 anni)		
	Stima	IC INF (95%)	IC SUP (95%)	Stima	IC INF (95%)	IC SUP (95%)
Cattura/Ricattura	1644,80	803,90	3846,79	1,99	0,97	4,66

Conclusioni

Il numero dei soggetti stimati come utilizzatori problematici per le sostanze indicate in questo studio, se rapportato a quello dell'utenza afferente ai Ser.T. negli anni precedenti* (nel 2011 n. 2866 utenti di cui nuovi n. 469, pari a circa il 16%) fa ritenere che negli anni futuri bisognerà prestare maggiore attenzione al fenomeno, ponendo le basi per la sperimentazione di percorsi di cura alternativi a quelli tradizionali, anche attraverso specifici interventi di prevenzione, che siano capaci di attrarre un numero maggiore di soggetti che non afferiscono ai servizi specialistici e che siano rivolti, in particolare, ai consumatori di sostanze stimolanti e/o dediti al poliabuso.

* fonte: "L'utenza Ser.T. in Sicilia anno 2011" – Rapporto regionale a cura dell'Assessorato alla Sanità – DASOE - Servizio 7 Osservatorio Epidemiologico